




БАБОЧКИ

СОСТАВИТЕЛИ ВИХРЕНКО



**Thysania
Agrippina Graner**

Ночная бабочка семейства Совок (Noctuidae). Считается самой крупной бабочкой мира. Нередко достигает размера 35 см в размахе крыльев. Населяет тропические леса Южной Америки.



**Papilio
Blumei Boisdwal**


Эндемик о-ва Сулавеси (Целебис)



Ornithoptera

Alexandrae Rotschild


Эндемик северо-восточной части о-ва Новая Гвинея (Папуа). Самки этого вида, достигая размеров 22 см в размахе крыльев, являются самыми крупными дневными бабочками мира. Вид назван английским натуралистом Уолтером Ротшильдом в честь русской царицы Александры (жены Николая II). Вид занесен в список СИТЕС



Ornithoptera

Urvilleana Guerin

Эндемик Соломоновых островов. Вид занесен в список СИТЕС.



Ornithoptera
Paradisea

Редкий эндемик восточной части о-ва Новая Гвинея. За свои необычные хвостообразные выросты на задних конечностях получила от известного немецкого натуралиста Отто Штаудингера свое название, что в переводе с латинского означает "райская". Вид занесен в список СИТЕС. Staudinger



Troides
magellanus C.&R. Felder

Эндемик Филлипинских о-вов. Желтые поля задних крыльев самцов под определенным углом отливают интенсивным синеватым блеском. Вид назван английскими натуралистами братьями Фельдерами в честь знаменитого мореплавателя Фернандо Магеллана. Занесен в список СИТЕС.



**Papilio
homerus Fabricius**

Самый крупный вид рода *Papilio*, достигающий 14 см в размахе крыльев. Редкий эндемик о-вов Гаити и Ямайка. Назван известным натуралистом Фабрициусом в честь древнегреческого поэта Гомера. Вид занесен в



**Parides
childrenae Gray**

Распространен в Северных Андах от Панамы до Эквадора.



Parides
orellana Hewitson

Эндемик верховой р. Амазонки (Перу). Вид назван английским натуралистом Хевитсоном в честь испанского конкистадора Орельяна.



Morpho
helena Staudinger

Эндемик верховой р. Амазонки (Перу).



**Morpho
phanodemis Hewitson**
Эндемик верхний р. Амазонки (Перу).



**Morpho
phanodemis Hewitson**
(Обратная сторона, т.е. низ)



**Prepona
praeneste Hewiston**

Редкий эндемик верховий р. Амазонки (Перу).




**Agrias
palus Bates**

Редкий эндемик средней Амазонки. Назван известным английским натуралистом Генри Бейтсом в честь последнего ассирийского царя Сарданапала.



Hipolimnas
dexitheia Hewitson
Редкий эндемик о-ва Мадагаскар



Cymothoe
coccinata Hewitson

Красивый редкий представитель тропических лесов Центральной Африки.
Распространен от Конго на западе до Уганды на востоке.




редкий парусник-император (*Parnassius imperator*) из Западного Китая



парусник людорфия Пуцило (*Luehdorfia ruziloii*), юг Дальнего Востока




хвостомолец Маака (*Papilio maackii*), Дальний Восток



адмирал (*Vanessa atalanta*)



южноамериканский представитель рода *Limenitis* из коллекции А.П. Генералова



сатурния (семейство Saturniidae) из Уганды



мешочница Цветаева (*Acanthopsyche tzvetaevi*)

